

BTVPUR AISap™ 8

Vaccin inactivé contre la maladie de la langue bleue (Bluetongue)
Suspension pour injection pour ovins et bovins

Composition

Une dose de 1 ml de vaccin contient :

Principe actif :

• Virus inactivé Bluetongue, sérotype 8 ≥ 0.72 U.S.N.*

Adjuvants :

• Aluminium (sous forme d'hydroxide)..... 2.7 mg

• Saponine 30 HU

Excipients q.s 1 ml

* 1 U.S.N. : q.s pour obtenir une séroconversion de 1 log₁₀

Indications

Immunsation active des ovins et des bovins pour prévenir la virémie et réduire les signes cliniques causés par le sérotype 8 du virus Bluetongue.

Propriétés / Effets

Le vaccin contient le sérotype 8 du virus inactivé Bluetongue. Il induit chez l'animal vacciné une immunité active et spécifique contre le sérotype 8 du virus Bluetongue.

La mise en place de l'immunité a été démontrée 31 jours après vaccination chez les ovins et 23 jours après la seconde vaccination chez les bovins.

La durée d'immunité n'a pas encore été établie.

Mode d'emploi et posologie

Agiter doucement juste avant l'emploi. Eviter la formation de mousse car cela peut être irritant au point d'injection.

Administrer une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon le schéma de vaccination suivant :

• Primovaccination :

Ovins

1 injection : Dès 1 mois d'âge ou, chez les agneaux nés de mères vaccinées, dès 2.5 mois d'âge.

Bovins

2 injections :

1ère injection : Dès 1 mois d'âge ou, chez les veaux nés de mères vaccinées, dès 2.5 mois d'âge.

2e injection : 1 mois après.

• Rappels :

1 injection chaque année, un mois avant l'apparition des arthropodes vecteurs en zones d'épidémie.

La validité du schéma vaccinal (rappel annuel) n'a pas été démontrée.

Contre-indications

Aucune.

L'impact de la présence des anticorps d'origine maternelle sur la vaccination n'a pas été étudié.

L'impact de la vaccination sur les fonctions reproductrices du mâle (spermatogenèse) n'a pas été étudié.

Effets secondaires

La vaccination peut être suivie par une légère réaction inflammatoire au site d'injection et / ou une légère hyperthermie, de courte durée.

Interactions

Aucune information n'est disponible concernant la compatibilité de ce vaccin avec d'autres vaccins. Par conséquent, l'innocuité et l'efficacité d'une association (vaccins mélangés ou non, utilisés le même jour ou à des périodes différentes) n'ont pas été démontrées.

Précautions

- Ne vacciner que les animaux en bonne santé.

- Respecter les conditions habituelles d'asepsie.

- Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques.

Mises en garde particulières

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez lui la notice ou l'étiquetage.

Conservation

A conserver réfrigéré (+2 °C à +8 °C) et à l'abri de la lumière. Conserver dans l'emballage original.

Tout flacon entamé doit être utilisé dans la même journée.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette.

Présentations

Flacon de 50 ou 100 doses.

Boîte de 10 flacons de 50 ou 100 doses.

N° IVI : 1695

Ne peut être administré que pour la vaccination ordonnée par l'Office vétérinaire fédéral.

Distributeur

Biokema SA

Crissier-Lausanne

BTVPUR AISap™ 8

Inaktivierter Impfstoff gegen die Blauzungkrankheit (Bluetongue)
Suspension zur Injektion für Schafe und Rinder

Zusammensetzung

Eine Dosis Impfstoff zu 1 ml enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

• Inaktiviertes Bluetongue-Virus, Serotyp 8 ≥ 0.72 SN E.*

Adjuvants:

• Aluminium (als Hydroxyd) 2.7 mg

• Saponin 30 HU

Excipients q.s 1 ml

* 1 SN E.: q.s um eine Serokonversion von 1 log₁₀ zu erhalten

Indikationen

Aktive Immunsierung von Schafen und Rindern zur Vorbeugung der Virämie und zur Verringerung klinischer Symptome verursacht durch den Serotyp 8 des Bluetongue-Virus.

Eigenschaften / Wirkungen

Der Impfstoff enthält inaktiviertes Bluetongue-Virus vom Serotyp 8. Er verleiht dem Tier eine aktive und speziell gegen den Serotyp 8 des Bluetongue-Virus gerichtete Immunität.

Der Beginn der Immunität wurde beim Schaf 31 Tage nach der Impfung und beim Rind 23 Tage nach der zweiten Impfung nachgewiesen.

Die Immunitätsdauer wurde noch nicht bestimmt.

Anwendung und Dosierung

Unmittelbar vor Gebrauch sorgfältig schütteln. Schaumbildung vermeiden, da dies eine Reizung an der Injektionsstelle hervorrufen kann.

Eine Impfdosis zu 1 ml wird subkutan entsprechend dem folgenden Impfplan verabreicht:

• Grundimmunsierung:

Schafe

1 Injektion: ab einem Alter von 1 Monat oder ab einem Alter von 2.5 Monaten bei Lämmern, die von geimpften Muttertieren geboren wurden.

Rinder

2 Injektionen:

1. Injektion: ab einem Alter von 1 Monat oder ab einem Alter von 2.5 Monaten bei Kälbern, die von geimpften Muttertieren geboren wurden.

2. Injektion: 1 Monat später.

• Wiederholungsimpfungen:

1 Injektion jährlich, 1 Monat vor Auftreten der als Vektoren agierenden Arthropoden in den Epidemiegebieten.

Die Gültigkeit des Impfschemas (jährliche Wiederholungsimpfung) wurde nicht gezeigt.

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Der Einfluss der Anwesenheit maternaler Antikörper auf die Impfung wurde nicht untersucht.

Der Einfluss der Impfung auf die männliche Fortpflanzung (Spermatogenese) wurde nicht untersucht.

Nebenwirkungen

Die Impfung kann eine leichte entzündliche Reaktion an der Injektionsstelle und / oder eine leichte Hyperthermie hervorrufen, welche aber von kurzer Dauer sind.

Wechselwirkungen

Über Wechselwirkungen mit anderen Impfstoffen liegen keine Informationen vor. Daher wurden weder die Unschädlichkeit noch die Wirksamkeit einer Kombination (gemischte Impfstoffe oder nicht, am gleichen Tag oder zu verschiedenen Zeitpunkten angewendet) gezeigt.

Vorsichtsmassnahmen

- Nur gesunde Tiere impfen.

- Übliche aseptische Kautelen beachten.

- Nicht mit einem anderen Impfstoff oder immunologischen Produkt mischen.

Warnhinweise

Im Falle einer versehentlichen Selbstinjektion ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich und die Packungsbeilage dem Arzt zu zeigen.

Lagerung

Kühl lagern (+2 °C bis +8 °C). Vor Licht schützen. In der Originalverpackung aufbewahren.

Einmal angebrochene Flaschen müssen am gleichen Tag aufgebraucht werden.

Außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Nach dem auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Handelsformen

Flasche zu 50 oder 100 Dosen.

Packung mit 10 Flaschen zu 50 oder 100 Dosen.

N° IVI: 1695

Darf nur für vom Bundesamt für Veterinärwesen angeordnete Impfungen verwendet werden.

Vertrieb

Biokema SA

Crissier-Lausanne